

【子宮体がん】

レジメン名	1クール	催吐リスク分類	備考
weeklyPTX単剤療法	4週間	軽度	
PTX単剤療法	4週間	軽度	
PTX+CBDCA	3週間	中等度	
DTX単剤療法	4週間	軽度	
DTX+CBDCA	3週間	中等度	
CDDP+EPI	3週間	高度	
ADR単剤療法	3週間	中等度	

【子宮頸がん】

レジメン名	1クール	催吐リスク分類	備考
PTX+CDDP+Bev	3週間	高度	
weeklyCPT-11	8週間	中等度	
biweeklyCPT-11単剤療法	6週間	中等度	

【卵巣がん】

レジメン名	1クール	催吐リスク分類	備考
weeklyPTX単剤療法	4週間	軽度	
PTX単剤療法	4週間	軽度	
Bev+PTX+CBDCA	3週間	中等度	
PTX+CBDCA	3週間	中等度	
Dd-PTX+CBDCA	4週間	中等度	
DTX単剤療法	4週間	軽度	
DTX+CBDCA	3週間	中等度	
Bev単剤療法	3週間	中等度	
Doxil単剤療法	4週間	軽度	
weeklyCPT-11	8週間	中等度	
biweeklyCPT-11	6週間	中等度	
weeklyGEM(1/8/15)(卵巣)	3週間	軽度	
CDDP腹腔内	4週間	高度	

【腹膜がん】

レジメン名	1クール	催吐リスク分類	備考
CBDCA腹腔内	4週間	中等度	

【絨毛奇胎】

レジメン名	1クール	催吐リスク分類	備考
MTX-FA	2週間	最小	
MTX単剤療法	12~14days	最小	