

【悪性神経膠腫】

レジメンCD	電子カルテ登録名	レジメン名	1クール	催吐リスク分類	備考
BS005	Bev(d1/15/29/42)[+TMZ併用]+RT導入期用	Bev[+TMZ併用]+RT導入期用	4週間	中等度	テモダールカプセル内服
BS006	Bev(d1/15)[+TMZ併用]維持療法用	《CCRT》維持療法用Bev[+TMZ併用]	3週間	中等度	テモダールカプセル内服
BS008	Bev単剤療法(2週法)(d1)	Bev単剤療法(2週法)	3週間	最小	
BS007	Bev(d1)3週法	Bev単剤療法(3週法)	3週間	最小	
BS009	維持療法用Bev+TMZ(d1)	維持療法用Bev+TMZ	4週間	中等度	
BS010	TMZ(1-42)+RT 導入期用	導入期用《CCRT》TMZ	4週間	中等度	

脳神経外科 05 Bev(d1,15,29,42)[+TMZ併用]+RT 導入期用【10W】※中

患者ID _____ 適応疾患名: _____ 医師名 _____

氏名 _____ 身長 _____ cm 体表面積 _____ m²

_____ 体重 _____ kg Ccr _____ mL/min

注射処方

Rp d-1, 15, 29, 42

① 生食 50 mL } 200mL/hr

② 生食 100 mL } ※70mL/hr
アバステチン mg

→

→

③ 生食 50 mL } 200mL/hr

内服

テモゾロミド mg 分1

→

→

	d1	d15	d29	d42	d43~70
アバステチン(Bev) 10mg/kg	↓	↓	↓	↓	休薬
テモゾール(TMZ) 75mg/m ²	d1~d42連続服用				
中等度催吐性リスク(内服カイトリルあり) デカドロン内服なし					

※最終アバステチンは42日目に投与

※ Radiation併用 2Gy/日を週5回
 総線量60Gy

脳神経外科 BS006 Bev(d1,15)[+TMZ併用]維持療法【4W】※中

患者ID	適応疾患名:	医師名
氏名	身長 <u> </u> cm	体表面積 <u> </u> m ²
	体重 <u> </u> kg	Ccr <u> </u> mL/min

注射処方

Rp d-1, 15

① 生食 50 mL } 200mL/hr

② 生食 100 mL } ※70mL/hr
アバステチン mg

→

→

③ 生食 50 mL } 200mL/hr

	d1	d15	d16~28
アバステチン(Bev) 10mg/kg	↓	↓	休薬
テモゾロミド(TMZ) 初回150mg/m ² 2回目以降200mg/m ² に増量可	d1~d5連続服用		
中等度催吐性リスク(内服グラネセトロンゼリーあり) デカドロン内服なし			

内服

テモゾロミド mg 分1

→

→

尿たんぱく4+又は尿蛋白/クレアチニン比が3.5以上でアバステチン休薬。

患者ID _____

適応疾患名: _____

医師名 _____

氏名 _____

身長 _____ cm

体表面積 _____ m²

体重 _____ kg

Ccr _____ mL/min

注射処方

Rp **d-1**

① 生食 50 mL } 200mL/hr

② 生食 100 mL } ※70mL/hr
アバステチン mg

→
 →

③ 生食 50 mL } 200mL/hr

	d1	d2~d14
アバステチン(Bev) 10mg/kg	↓	休薬
最小度催吐性リスク デカドロン内服なし		

患者ID _____

適応疾患名: _____

医師名 _____

氏名 _____

身長 _____ cm

体表面積 _____ m²

体重 _____ kg

Ccr _____ mL/min

注射処方

Rp **d-1**

① 生食 50 mL } 200mL/hr

② 生食 100 mL } ※70mL/hr
アバステチン mg

→ / ~
 → / ~

③ 生食 50 mL } 200mL/hr

	d1	d2～d21
アバステチン(Bev)	↓	休薬
15mg/kg		
最小度催吐性リスク デカドロン内服なし		

患者ID _____ 適応疾患名: _____ 医師名 _____
 氏名 _____ 身長 _____ cm 体表面積 _____ m²
 体重 _____ kg Ccr _____ mL/min

注射処方

- Rp **d-1**
- ① グラネセロン1mg+生食100mL 1 Set } 170mL/hr
 - ② 生食 100 mL } ※70mL/hr
アバステン mg
 → / ~
 → / ~
 - ③ 生食 50 mL } 170mL/hr
 - ④ 生食 250 mL } 170mL/hr
テモダール mg
- 注射用水 $41 \times V$ mL (溶解用)
 薬剤部は注射用水で先に溶解し、全量250mLとせよ
 → / ~
 → / ~
- ⑤ 生食 50 mL } 170mL/hr

	d1	d15	d16~28
アバステン(Bev) 10mg/kg	↓	↓	休 薬
テモダール(TMZ) 初回150mg/m ² 2回目以降200mg/m ² に増量可	d1~5 ↓ 5日間 連投		
中等度催吐性リスク デカドロン内服なし			

テモダール 1瓶につき注射用水41mLで溶解
 (2.5mg/mL含有)
 そこから必要量全量を計算し、入れる量だけ
 生食250mLから生食を抜き取る。
 必ず全量250mLとすること

2枚目あり

1枚目あり

Rp 3、4、5

① グラニセロン1mg+生食100mL 1 Set }/hr

② 生食 250 mL }/hr
テモダール mg }

注射用水 41×V mL (溶解用)
 薬剤部は注射用水で先に溶解し、
 全量250mLとせよ

→	/ ~
→	/ ~

③ 生食 50 mL }/hr

テモダール 1瓶につき注射用水41mLで溶解
 (2.5mg/mL含有)
 そこから必要量全量を計算し、入れる量だけ
 生食250mLから生食を抜き取る。
 必ず全量250mLとすること

Rp d-15

① 生食 50 mL }/hr

② 生食 100 mL }
アバスチン mg }[※]₇₀

→	/ ~
→	/ ~

③ 生食 50 mL }/hr

患者ID _____ 適応疾患名: _____ 医師名 _____

氏名 _____ 身長 _____ cm 体表面積 _____ m²

_____ 体重 _____ kg Ccr _____ mL/min

***初発悪性神経膠腫用のレジメンです**

注射処方

Rp **d-1~42**

① グラニセロン1mg+生食100mL 1 Set } 170mL/hr

② 生食 250 mL } 170mL/hr
テモダール mg

注射用水 $41 \times V$ mL (溶解用)

薬剤部は注射用水で先に溶解し、
 全量250mLとせよ

③ 生食 50 mL } 170mL/hr

	d1~42	d43~70
テモダール(TMZ) 75mg/m ²	↓ 42日間 連投	休薬
中等度催吐性リスク 内服デカドロンなし		

テモダール 1瓶につき注射用水41mLで溶解
 (2.5mg/mL含有)
 そこから必要量全量を計算し、入れる量だけ
 生食250mLから生食を抜き取る。
 必ず全量250mLとすること