

**【悪性黒色腫】**

レジメンCD	電子カルテ登録名	レジメン名	1クール	催吐リスク分類	備考
SK001	DAVFeron	CapeOX	4週間	高度	

患者ID

適応疾患名:

医師名

氏名

身長

cm

体表面積

m<sup>2</sup>

体重

kg

Ccr

mL/min

注射処方

Rp **d-1**

- ① グラネセロン1mg+生食100mL 1 Set } 100mL/hr  
 デキサート 3 mL
- ② 生食 100 mL } 100mL/hr  
 ダカルバジン **100** mg
- ※本体・ルート全体を遮光すること
- ③ 生食 50 mL } 全開
- ④ 注射用水 50 mL } 全開  
 ニドラン **100** mg
- ⑤ 生食 50 mL } 全開
- ⑥ 生食 50 mL } 全開  
 オンコビン **1** mg
- ⑦ 生食 50 mL } 全開  
 ⑦終了後、ヘパロック可
- ⑧ 0.5%プロカイン 0.5 mL } 局注  
 フェロン 1 瓶

	d1	d2~5	d6,7	d8-28
ダカルバジン (DTIC) 100mg/body/day	↓	↓		
ニドラン (ACNU) 100mg/body/day	↓			休
オンコビン (VCR) 1mg/body/day	↓			薬
フェロン (IFN β) 300万IU/body/day	↓	↓	↓	
中等度催吐リスク デカロン内服なし(注射で使用)				

Rp **d-2,3,4,5**

- ① グラネセロン1mg+生食100mL 1 Set } 100mL/hr  
 デキサート 2 mL
- ② 生食 100 mL } 100mL/hr  
 ダカルバジン **100** mg

※本体・ルート全体を遮光すること

- ③ 生食 50 mL } 100mL/hr  
 ③終了後、ヘパロック可
- ④ 0.5%プロカイン 0.5 mL } 局注  
 フェロン 1 瓶

Rp **d-6,7**

- ① 0.5%プロカイン 0.5 mL } 局注  
 フェロン 1 瓶